

# Informace pro pacienta

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

**CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ BARTHOLINIHO ŽLÁZY**

**CHEMOEXTIRPACE CYSTY BARTHOLINIHO ŽLÁZY**

**CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ ABSCEU BARTHOLINIHO ŽLÁZY**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem operačního výkonu je odstranění celé cysty.

Bohužel žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné.

**Během operace může dojít:**

- K silnějšímu krvácení s vytvořením krevní sraženiny pod kůží (modřina),
- výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické úchytky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů (především močové trubice nebo konečníku); tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci,
- velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrtně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci; tyto změny ve většině případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají trvalé následky,
- další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy; bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař-anesteziolog.

**Po operaci může dojít k těmto komplikacím:**

- k dočasné poruše vyprazdňování močového měchýře v případě, že se ložisko nachází v blízkosti ústí močové trubice,
- k infekci operační rány s nutností podat antibiotika, velmi vzácně k vytvoření hnisavého výpotku - abscesu, který je nutno vyprázdnit,
- velmi vzácná je trombóza - vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a "embolie" - zanesení těchto sraženin např. do plic; tam může v krajním případě dojít k uzavření žilního řečiště a smrti.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Tento výkon nemá alternativu.


Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Cysta nebo absces (hnisavý váček) Bartholiniho žlázy vzniká většinou pomnožením sekretu nebo bakterií po samovolném uzávěru vývodu žlázy. Operační výkon se provádí v krátkodobé celkové anestezii. Při vytvoření abscesu se v místě největšího vyklenutí abscesu prořízne, hnis se vypláchne a dovnitř se vloží drén (hadička), aby odvedl zbytkový sekret. V případě prosté cysty probíhá operační výkon ve dvou dobách: nejprve se po rozříznutí do cysty vloží lápisový kámen a zašije a po 48 hodinách se vyjme spolu s výstelkou cysty a vzniklá rána se zašije.

Cysty i abscesy Bartholiniho žlázy se velmi často opakují. V takových případech se provádí chirurgické odstranění celé cysty, při kterém se celá cysta vyřízne vcelku a vzniklá rána se plasticky uzavře.

Průběh operace může být digitálně dokumentován a prezentován (fotodokumentace, videozáznam). VFN se zavazuje, že to bude provedeno zcela anonymně, že nebude zaznamenán žádný Váš charakteristický rozpoznávací znak (zejména obličej) a ani na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími identifikačními znaky nebude možná plná identifikace Vaší osoby.

# Informace pro pacienta



Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Předpokládaná doba pobytu v nemocnici je 1 - 2 dny. Po operaci je nutná rekonvalescence, potřebná k plnému vyhojení, v trvání 1 - 2 týdnů. Během této doby je nutné se tělesně šetřit a nemít pohlavní styk. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.

Další potřebná léčba:

Žádná