

# Informace pro pacienta

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

## **OPERACE PRO ZHOUBNÝ NÁDOR DĚLOŽNÍHO TĚLA S ODSTRANĚNÍM:**

### **DĚLOHY S NÁDOREM**

### **OBOU VAJEČNÍKŮ I S VEJCOVODY**

### **SPÁDOVÉ MÍZNÍ UZLINY V PÁNVI**

### **SPÁDOVÉ MÍZNÍ UZLINY KOLEM AORTY A DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY**

### **OMENTA (PŘEDSTĚRY)**

### **SLEPÉ STŘEVO**

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu: Při operaci jsou běžně chirurgicky odstraněny výše uvedené orgány.

Bohužel žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné.

#### **Během operace může dojít:**

- k silnému krvácení s nutností podat krevní převod (informujte se na možnost autotransfuze), velmi vzácnou komplikací může být poranění velké tepny, které může vést až ke smrtelnému krvácení,
- výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické úchytky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů (močový měchýř, močová roura, močovody, tlusté a tenké střevo, velké cévy, nervy); tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci,
- velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci; tyto změny ve většině případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají trvalé následky,
- při dlouhotrvajícím operačním výkonu může dojít k místnímu poškození kůže v místě jejího styku s podložkou, kterému nelze v ojedinělých případech, zejména u obézních pacientek, přes preventivní opatření zabránit,
- další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy; bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař anesteziolog.

#### **Po operaci může dojít k těmto komplikacím:**

- k dočasné poruše vyprazdňování močového měchýře a střevních kliček, která pozvolna během 3 dnů odezní,
- k infekci operační rány, dutiny břišní či močových cest s nutností podat antibiotika, velmi vzácně k vytvoření hnisavého výpotku - abscesu, který je nutno vyprázdnit,
- Vzácnou komplikací jsou "píštěle" - samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou, která pak úpravě stavu vyžadují další operační výkon,
- velmi vzácná je trombóza - vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a "embolie" - zanesení těchto sraženin např. do plic; tam může v krajním případě dojít k uzavření žilního řečiště a smrti.


Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: Tato operace nemá alternativu.

#### **Zdravotní výkon bude probíhat takto:**

Po odstranění dělohy s nádorem, vejcovodů a vaječnicků břišní cestou z podélného řezu mezi sponou stydkou a pupkem bude posouzen rozsah nádorového postižení. V případě, že nádor se šíří směrem k povrchu dělohy, nebo má podle předchozího histologického vyšetření nepříznivé charakteristiky, bude řez rozšířen nad pupek a odstraněny spádové mízní uzliny v pánvi eventuálně podél velkých cév (vedle aorty a duté žíly). V případě, že je nádorový proces pokročilý, pak je cílem odstranění co možná největší množství nádorové hmoty. V případě, že došlo ke zjištění zhoubného nádoru mikroskopickým vyšetřením dělohy po předchozí operaci, pak je nutné provedení druhé operace, jejímž cílem je odstranit tkáň, ve kterých je nádor přítomen nebo ve kterých se může šířit.

Průběh operace může být digitálně dokumentován a prezentován (fotodokumentace, videozáznam). VFN se zavazuje, že to bude provedeno zcela anonymně, že nebude zaznamenán žádný Váš charakteristický rozpoznávací znak (zejména obličej) a ani na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími identifikačními znaky nebude možná plná identifikace Vaší osoby.

# Informace pro pacienta



Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Odstranění jednoho vaječníku neovlivní další život ženy. Po odstranění obou vaječníků dojde k potížím spojeným s nedostatkem ženských pohlavních orgánů (návaly, nespavost, osteoporóza), které je možno nahradit následně pomocí tablet nebo náplastí. V případě, že již nemáte menstruaci a jste v přechodu, nemá odstranění vaječníků tyto důsledky. Naopak jejich odstranění Vás do budoucna zbavuje rizika jejich zhoubného zvrhnutí.

Odstranění dělohy znamená ukončení plodnosti a menstruace, ale neovlivňuje průběh dalšího intimního života.

Předpokládaná délka hospitalizace je 8 - 10 dní. Po operaci je nutná rekonvalescence potřebná k plnému vyhojení v délce 3 - 5 týdnů. Během této doby je nutné se tělesně šetřit, nemít pohlavní styk a intenzivně rehabilitovat.

**Další potřebná léčba:**

Další potřebná léčba závisí na rozsahu operace a histologickém nálezu. Váš ošetřující lékař Vám sdělí všechny potřebné informace.