

Informace pro pacienta

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů): LASEROVÉ OŠETŘENÍ ZEVNÍHO GENITÁLU, POCHVY

A HRÁZE

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Účelem ošetření je splnění léčebného, případně estetického cíle, v tomto případě zpravidla odstranění kožních útvarů. K výkonu je užito světelného paprsku CO₂ laseru, jehož energie je dostatečná k tomu, aby jím bylo umožněno operovat měkké tkáně. Vzniklá rána se vzhledem k šetrnosti řezu nemusí šít, zhojí se stejně jako jakékoliv povrchové poranění pouze strupem. Odstraněný kožní útvar je v případě indikace odeslán na histopatologické vyšetření.

Bohužel žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné.

Během operace může dojít:

- k popálení okolních tkání,
- poškození zraku laserovým paprskem,
- k silnějšímu krvácení s vytvořením krevní sraženiny pod kůží (modřina),
- výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické odchylky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů (především močové roury nebo konečníku); tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci,
- velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci; tyto změny ve většině případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají trvalé následky,
- další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy; bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař-anesteziolog.

Po operaci může dojít k těmto komplikacím:

- dle citlivosti a typu kůže nežádoucí pigmentace ošetřené plochy, nebo naopak,
- snížená tvorba pigmentu v místě ošetření, která může přetrvávat po dobu měsíců i let,
- k dočasné poruše vyprazdňování močového měchýře v případě, že ložisko je lokalizované v blízkosti ústí močové roury,
- k infekci operační rány s nutností podat antibiotika, velmi vzácně k vytvoření hnisavého výpotku - abscesu, který je nutno vyprázdnit,
- v případě infekce v ráně může dojít k nežádoucímu jizvení,
- v oblasti použití laseru může dojít k menší nebo naopak větší citlivosti kůže, eventuálně k parestezii - nepříjemný pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže.
- velmi vzácná je trombóza - vytvoření krevních sraženin v žilách např. pánevního dna a embolie - zanesení těchto sraženin např. do plic; tam může v krajním případě dojít k uzavření žilního řečiště a ke smrti.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Tento výkon má alternativu za použití jiných chirurgických metod, ale na základě poznatků současné medicíny je při tomto laserovém zákroku, při nekomplikovaném průběhu pooperačního hojení, dosaženo nejlepšího estetického výsledku.

Informace pro pacienta

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Tento výkon se zpravidla provádí v celkové narkóze, nebo v místním znečítlivění a probíhá za krátké hospitalizace. Operatér odstraní paprskem postiženou část nebo nežádoucí tkán z povrchu kůže ve zvolené oblasti.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Předpokládaná doba pobytu v nemocnici je 1-2 dny. Po operaci je nutná rekonvalescence, potřebná k plnému vyhojení, v trvání 6-8 týdnů. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel spočívající v oplachu ranné plochy studeným černým čajem několikrát denně a sušení studeným fénem. Po vytvoření strupů je třeba ošetřená místa promašťovat po dobu několika týdnů až měsíců.

Další potřebná léčba:

Výkon je pro dosažení maximálního efektu někdy nutno i vícekrát opakovat.