

Informace pro pacienta

Označení zdravotního výkonu (popřípadě několika výkonů):

REVIZE (KONTROLA) DUTINY DĚLOŽNÍ PO PORODU

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Cílem tohoto zákroku je vyprázdnění dutiny děložní po porodu a odstranit tak zadržené části placenty nebo plodových obalů (blan), které mohou způsobit silné krvácení a zánět dělohy.

Bohužel žádný výkon není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a řešitelné.

Během operace může dojít:

- k silnému krvácení s nutností podat krevní převod (transfuzi),
- i přes pečlivou operační techniku může dojít k poranění dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu, ve výjimečném, krajním případě až k odstranění dělohy,
- výjimečné, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické odchylky) může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů (močový měchýř, močová trubice, močovody, tlusté a tenké střevo, nervy); tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci,
- velmi vzácně k otlakům měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci, tyto změny ve většině případů odezní během několika týdnů a málokdy zanechají trvalé následky,
- další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy, bližší informace Vám poskytneme před operací přímo anesteziolog.

Po operaci může dojít k těmto komplikacím:

- infekce dutiny děložní či močových cest s nutností podat antibiotika, velmi vzácně k vytvoření hnisavého výpotku - abscesu, který je nutno vyprázdnit,
- velmi vzácná je trombóza - vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna a „embolie“ - zanesení těchto sraženin např. do plic. Tam může v krajním případě dojít k uzávěru cévního řečiště a smrtelným komplikacím.


Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Tento výkon nemá alternativu.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Operace se provádí v narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Po roztažení hrdla děložního je obsah dutiny děložní odstraněn kyretou. Doba trvání výkonu je cca 10 - 15 minut.

Informace pro pacienta



Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Předpokládaná délka hospitalizace po zákroku je 2 - 3 dny. Po operaci je nutné dodržovat běžný šestinedělní režim - šetřit se, dodržovat zvýšenou hygienu zevních rodidel, slabé krvácení po výkonu by se pozvolna mělo změnit na běžné očistky v šestinedělí. Menstruace se dostaví za 4 -6 týdnů po výkonu.

Další potřebná léčba:

Další léčba není nutná.