


Informace pro pacienta

Označení zdravotního výkonu

VYJMUTÍ NEZHOUNBÉHO LOŽISKA Z PRSU

Účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu:

Jde o odstranění nezhoubného ložiska z prsu pro jeho růst, nepoměr mezi velikostí ložiska a prsu a následným útlakem okolí včetně vyklenování kůže, možný biologický zvrát ve zhoubný nádor či nemožné určení biologické povahy celého ložiska přes jeho předoperační mikroskopické vyšetření punkcí (napíchnutím). Někdy bývá i účelem operace odstranění nezhoubného ložiska reagujícího nadměrně na změny v hormonálním cyklu.



Jako každá operace má i tato svoje rizika, i když velmi málo pravděpodobná. Může dojít ke krvácení během operace či po operaci, může dojít ke zhmoždění tkání. V krajním případě mohou závažné komplikace během operace nebo v pooperačním období způsobit smrt. U místního znecitlivění může dojít k alergické reakci, která může vyústit v šok. U celkové anestezie Vás s možnými komplikacemi podrobněji seznámí anesteziolog. Vzácně může pooperačně dojít k žilní tromboze a následně embolizaci (vmetku) do plic. Z pooperačních komplikací se může jednat o hnisání v ráně, hojení širokou či vyvýšenou nadměrnou jizvou.

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika:

Sledování a časté vyšetřování pomocnými metodami rentgenologickými, ultrazvukovými, magnetickou rezonancí apod.

Zdravotní výkon bude probíhat takto:

Výkon se provádí nejčastěji v celkové anestezii, při drobných nálezech podkožně uložených nádorů i v možném místním znecitlivění z kosmeticky vhodného řezu nad nádorem eventuálně při pohyblivých nádorech vůči okolí z řezu kosmeticky výhodného (v rýze pod prsem, při okraji dvorce apod.), poté je vyjmut celý nádor. V případě nádorů s určitou biologickou nejistotou z opakování nádoru v témže místě se nádor odstraní i s lemem makroskopicky zdravé okolní tkáně. Po

Informace pro pacienta

odstranění nádoru se provede uzávěr dutiny většinou uzavřením kůže bez nutnosti drenáže (zavedení hadičky), u větších nádorů s drenáží.

Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a případné změny zdravotní způsobilosti po provedení uvedeného zdravotního výkonu:

Omezení obvyklého způsobu života je krátké, většinou návrat do plné pracovní schopnosti je do 2

- 3 týdnů.

Další potřebná léčba:

Doba hospitalizace se pohybuje kolem 3 dnů, stehy odstraňujeme ambulantně 7. - 10. den. Většina operovaných je kontrolována pravidelně v příslušné poradně.